

意見書の作成について（お願い）

担当医 様

子ども達がお世話になります。

星ヶ峯幼稚園・保育園は同一敷地内・施設内に開設され乳幼児が集団で長時間生活しています。

もし、当園在園児が下記の感染症であると診察された場合は、感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となつてからの登園であるようご配慮ください。この様式は厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」を参考に作成したものです。どうぞよろしくお願ひ致します。

隈元学園星ヶ峯幼稚園・保育園 園長

<医師用>

<h2 style="margin: 0;">意 見 書</h2> <p style="margin: 10px 0;">学校法人隈元学園 星ヶ峯幼稚園長・保育園長 殿</p> <p style="margin: 10px 0;">氏 名 []</p> <p style="margin: 10px 0;">病 名 []</p> <p style="margin: 10px 0;">上記疾患で、令和 年 月 日より当院に通院加療中です。</p> <p style="margin: 10px 0;">令和 年 月 日から集団生活をするに支障はないと思われます。</p> <p style="margin: 10px 0;">令和 年 月 日</p> <p style="margin: 10px 0;">医療機関</p> <p style="margin: 10px 0;">医師名 印又はサイン</p>	
---	--

○ 医師が記入した意見書が望ましい感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	症状が有る期間（発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い）	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで（幼児（乳幼児）にあつては、3日を経過するまで）
風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう）	発しん出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認るまで
咽頭結膜熱（プール熱）	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 （O157、O26、O111等）		症状が治まり、かつ、抗菌薬によって、いずれも菌陰性が確認治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便にたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数ヶ月排出される	医師により感染の恐れがないと認るまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認るまで

確認印	受理 No. () 令和 年 月 日	園長	主任	担任
-----	--	----	----	----